

# Wells score PE(簡易版)

	点数
DVTの臨床的兆候	+ 1
PTE以外の可能性が低い	+ 1
心拍数が100以上	+ 1
最近の手術あるいは長期臥床	+ 1
PTEあるいはDVTの既往	+ 1
血痰	+ 1
癌	+ 1

合計点数	臨床的確率
0 ~ 1 点	低い
2点以上	高い

Gibson NS, Sohne M, Kruip MJ, et al. Christopher study investigators. Further validation and simplification of the Wells clinical decision rule in pulmonary embolism. Thromb Haemost 2008; 99: 229-234.

# Wells score DVT

	点数
活動性の癌(治療中、6ヶ月以内の治療や緩和治療を含む)	+ 1
完全麻痺、不全麻痺あるいは最近のギブス装着による下肢の固定	+ 1
臥床安静3日以上または12週以内の全身麻酔もしくは部分麻酔を伴う大手術	+ 1
下肢深部静脈の走行に沿った圧痛	+ 1
下肢全体の腫脹	+ 1
腓腹部(脛骨粗面の10cm下方)の左右差>3cm	+ 1
症状のある下肢の圧痕性浮腫	+ 1
表在静脈の側副血行路の発達(静脈瘤ではない)	+ 1
DVTの既往	+ 1
DVTと同等もしくはそれ以上の可能性のある他の診断がある	- 2

低確率	0
中確率	1~2
高確率	3以上